

OKTOBER 2002

RETNINGSLINJER FOR TILTAK VED MISTANKE OM LEPTOSPIROSE HOS GRIS, OKTOBER 2002

I forbindelse med en konkret sak har Fylkesveterinæren for Trøndelag utarbeidet en mal for forvaltningsmessig håndtering av tilfeller med mistanke om leptospirose hos gris.

Sentralforvaltningen anbefaler at denne malen legges til grunn i slike saker.

Pålegg av restriksjoner

Besetning med kliniske symptomer forenlig med leptospirose og positiv serologi gir grunnlag for å pålegge besetningen restriksjoner på mistanke om leptospirose, jf forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer § 18.

Distriktsveterinæren kan, etter å ha varslet tilsynsveterinæren, tillate at dyr føres ut av besetningen til slakteri.

Opphevelse av restriksjonene

Kriterier som skal være oppfylt før restriksjonene kan oppheves:

1. Reproduksjonsresultatene i besetningen skal være normalisert.
2. Følgende saneringstiltak skal være gjennomført:
 - a. Mest mulig seksjonert drift. Gode smittesluser mellom avdelingene, og riktig rekkefølge på arbeidsoperasjonene.
 - b. Vask og desinfeksjon av alle avdelinger av grisehuset.
 - c. Bekjempelse av rotter og mus.
 - d. Behandling av alle griser i føde/gjeldpurkeavdelingen og i smågrisavdelingen etter et opplegg anbefalt av Helsetjeneste for svin.
 - e. I stedet for behandling av slaktegrisene (slaktefrist på medisiner) bør slaktegrishuset tømmes, vaskes og desinfiseres.
3. Eventuelle nyinnkjøpte dyr skal være testet negativt og behandlet for leptospirer. Dyr som tester positivt skal ikke tas inn i besetningen.

Så lenge det ikke er gode nok kunnskaper om forekomsten av seroreagenter på landsbasis, vil det ikke være hensiktsmessig å sette krav om testing av dyrene som betingelse for oppheving.