

Swirski Mite

Rovmidd (*Amyseius swirskii*)

Bruksformål: Til bekjempelse av amerikansk blomstertrips, veksthusmellus og bomullsmellus.

Sammensetning: Småpakker med krok; med rovmidd, lagringsmidd og kli.



HELSESKADELIG

ADVARSEL

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Unngå innånding av støv.

Unngå hudkontakt.

Reg.Nr.: 2006.19.

Nettoinnhold: 10.000 rovmidd.

Tilvirker: Koppert B.V. – Veilingweg 17 – NL-2650 AD Berkel e. R

Leverandør: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK - 8200 Århus N

Importør: VekstMiljø as, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.

Bruksområde:

Agurk, tomat, paprika, kryddervekster, jordbær og pryddplanter i veksthus. Ikke anbefalt i tomat, pga. dårlig etablering.

Virkeområde:

A. swirskii bekjemper unge stadier av amerikansk blomstertrips (*Frankinella occidentalis*), samt egg og 1.nymfestadie hos veksthusmellus (*Trioleurodes vaporariorum*) og bomullsmellus (*Bremisia tabaci*).

Virkemåte:

Nymfer og voksne av A. swirskii stikker munndelene inn i byttet og suger ut kroppsvæsken av byttedyret. Byttedyret skrumper inn etter å ha blitt sugd ut, og er derfor vanskelig å oppdage i kulturen.

Utseende:

Egg: avlange, transparent hvite

Nymfer og voksne: beigerosa, dråpeformet, litt nedtrykt med korte bein.

Klimakrav:

Middens jobber optimalt ved temperaturer mellom 25-28 °C og luftfuktighet 60-90 %. Under 15 °C er middens inaktiv.

Bruksrettledning:

Rist og vend flasken forsiktig før innholdet henges på infiserte planter, eller legges på dyrkingsmediet

	Ant/ m ²	Ant. m ² / 12.500 dyr	Intervall	Ant. behandlinger
Forebyggende	20	625	-	1 x
Lett bekjempelse	50	250	-	1 x
Kraftig bekjempelse	100	125	-	1 x

Integrert plantevern:

Kan brukes sammen med andre nyttedyr. Ved bruk av kjemiske plantevernmidler, bruk midler som er skånsomme for nyttedyr. Ta ellers kontakt med importør.

Oppbevaring:

Rovmiddens kan oppbevares mørkt ved 10 - 15 °C i maks 1 - 2 dager.

Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering:

Rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastavfall kildesorteres.

Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.): se forpakningen.

Swirski Mite Plus

Rovmidd (*Amyloseius swirskii*)-småpakker

Bruksformål: Til bekjempelse av amerikansk blomstertrips, veksthusmellus og bomullsmellus.

Sammensetning: Småpakker med krok; med rovmidd, lagringsmidd og kli.



HELSEKADDELIG

ADVARSEL

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Unngå innånding av støv.
Unngå hudkontakt.

Reg.Nr.: 2006.19.

Nettoinnhold: 100/500 småpakker med 250 midd.

Tilvirker: Koppert B.V. – Veilingweg 17 – NL-2650 AD Berkel e. R

Leverandør: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK - 8200 Århus N

Importør: VekstMiljø as, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.

Bruksområde:

Agurk, tomat, paprika, kryddervekster, jordbær og pryddplanter i veksthus. Ikke anbefalt i tomat, pga. dårlig etablering.

Virkeområde:

A. swirskii bekjemper unge stadier av amerikansk blomstertrips (*Frankinella occidentalis*), samt egg og 1.nymfestadie hos veksthusmellus (*Trioleurodes vaporariorum*) og bomullsmellus (*Bremisia tabaci*).

Virkemåte:

Nymfer og voksne av A. swirskii stikker munndelene inn i byttet og suger ut kroppsvæsken av byttedyret. Byttedyret skrumper inn etter å ha blitt sugd ut, og er derfor vanskelig å oppdage i kulturen.

Utseende:

Egg: avlange, transparent hvite

Nymfer og voksne: beigerosa, dråpeformet, litt nedtrykt med korte bein.

Klimakrav:

Middene jobber optimalt ved temperaturer mellom 25-28 °C og luftfuktighet 60-90 %. Under 15 °C er midden inaktiv.

Bruksrettledning:

Posene henges opp i plantene eller legges på dyrkingsmediet.

	Ant poser/ m ²	Intervall (dager)	Ant. behandlinger
Forebyggende	0,4	42	-
Lett bekjempelse	0,4	28	-
Kraftig bekjempelse	1	28	-

Integrert plantevern:

Kan brukes sammen med andre nyttedyr. Ved bruk av kjemiske plantevernmidler, bruk midler som er skånsomme for nyttedyr. Ta ellers kontakt med importør.

Oppbevaring:

Rovmidlen kan oppbevares mørkt ved 10 - 15 °C i maks 1 - 2 dager.

Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering:

Rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastavfall kildesorteres.

Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.): se forpakningen.