

Basagran® SG

Bentazon, vannløselig granulat

0,5 kg

 **BASF**
We create chemistry

Mot ugras i ert til konserver, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjennlegg med hvit; rød eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Sammensetning:
Natriumsalt av bentazon 950 g/kg
(Tilsvarende 870 g bentazon pr. kg)
Andre stoffer 50 g/kg

FARE

Farlig ved svelging.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeskade.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kan forårsake grunnvannsforurensning.
VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN / en lege.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN / en lege.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Unngå innånding av støv/aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Behandlingsfrist: Ert, bønne : 28 dager.

Avgiftsklasse 2

Tilvirker:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
Tyskland

Importør:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
Postboks 563
NO-1327 Lysaker
Tlf.: 66 79 21 00

Nødtilfelle:
BASF Service telefon:
+49 180 2273 112
Giftinformasjonen:
tlf. 22 59 13 00

REG.NR. 2006.23.14

Batchnr. / Produksjonsdato: Se emballasjen.
Holdbarhet: Minimum 2 år.

xxxx NO 1054

© = Registrert varemerke tilhørende BASF



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Basagran SG i strid med godkjent bruksområde, behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Basagran SG er tillatt brukt til bekjempelse av ugras i ert til konserver, ert til modning, fôrt, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjennlegg med hvit; rød eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr

med eller uten korn som dekkvekst.

For beskyttelse av grunnvann er det ikke anbefalt å benytte produktet på jord som har høyt grunnvann (<1 meter), grunn kalkholdig jord eller i jord med lav organisk karbon innhold (<1,7%). Det er anbefalt å ha en bufferson på minst 5 meter til overflatevann (gjelder også dreneringsgrøfter).

Behandlingsfrist: Ert, bønne og må ikke behandles senere enn 28 dager før høsting.

VIKEMÅTE

Basagran SG er et kontaktmiddel. Best virkning oppnås ved behandling fra frøbladstadiet og til ugrasplantene har 2 – 4 blad. Virkningen begynner å vise seg etter ca 1 uke.

UGRASVIRKNING

Basagran SG har spesielt god virkning mot balderbrå og klengemaure og god virkning mot gullkrage, hønsegras, tumbalderbrå, åkergråurt, linbendel, åkersvineblom, vassarve, haremat, tranehals og korsblomstra ugras. Virkningen mot meldestokk og då er ofte ujevn og svak, og den er dårlig mot tungras, rødtvetann og åkerstemorsblom. Plantene må fuktes godt.

BRUKSRETTLING

Ert.

Bruk 50 – 60 g Basagran SG pluss 80 – 100 ml Fenix®1 pr.dekar i 20 – 40 liter vann.

Blanding med Fenix bedrer effekten mot meldestokk. Sprøyt blandingen med Fenix når erteplantene er 5 – 8 cm høye (4 nodier).

Bønne. Bruk 100 – 140 g pr.dekar i 20 – 40 liter vann når det andre trekopla bladet på bønneplantene er under utvikling. I varmt vær kan forbigående sviing av bladrender og –spisser oppstå. Der oppnås beder virkning mot ugraset ved å dele opp dosan. Start med 15 – 20 g/da på frøbladstadiet til bønnen, og sprøyt på nytt etter 1 uke med 20 – 25 g/da. Nye sprøyting med 30 – 35 g/da gjennomføres så 2 – 3 ganger med 10 dages mellomrom.

Frøeng av rødkløver og timotei. Bruk 160 g pr.dekar i 20 – 40 liter vann. Sprøyt tidlig om våren så snart ugraset er kommet i vekst. Kløveren bør være ca 5 cm og timoteien ca 10 cm. Om nødvendig kan behandlingen gjentas etter 2 – 3 uker.

Gjennlegg med hvit, rød eller alsikekløver i frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Bruk 115 g pr. dekar i 20 – 40 liter vann.

Behandling

– med gjennlegg: kløver/ minst spadbladstadiet (første bladet)

– uten gjennlegg: kløver/ 1 – 2 trekobla blad (vanlig kløverblad)

Tillsetning av olje (Renol, 50 ml/daa) gir en sikere ugraseffekt mot meldestokk.

Tillaging av sprøytevæske. Fyll vann i tanken. Start røreverket og tilsett Basagran SG og eventuelt Fenix langsomt.

Værforhold. Basagran SG har best virkning når ugraset er i god vekst. Ved lav temperatur kommer virkningen mer langsomt og blir svakere enn ved høy temperatur. Temperaturen ved sprøyting må ikke være for lav, men viktigere enn dagtemperatur er en noenlunde jevn døgntemperatur. Unngå å sprøyte like etter ei frostnatt eller når det er fare for nattefrost.

I særlig varmt vær er kulturplantene mer utsatt for skade enn ved midlere temperaturer. Bønne og ert er mest ømfintlige og bør ikke sprøytes hvis temperaturen er over ca 18 °C. Det frarådes å sprøyte i sterkt solskinn midt på dagen.

Regn de første timene etter sprøyting kan føre til redusert ugrasvirkning.

Forsiktighetsregler.

Bruk vernehansker av f.eks. nitril-gummi, ansiktsskjerm, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Håndteringsfrist.

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

Rengjøring av sprøyteutstyret.

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken.

Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettlingsanvisning. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering.

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring.

Lagres tørt. Holdbarhet: Minimum 2 år.

MERK.

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, kulturplantesorter, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

® Registrert varemerke for BASF Aktiengesellschaft.

®1 Registrert varemerke for Bayer



Basagran® SG

Bentazon, vannløselig granulat

0,5 kg

 **BASF**
We create chemistry

Mot ugras i ert til konserver, ert til modning, fôrert, bønne til konsum, åkerbønne til modning og grønnfôr og frøeng av rødkløver og timotei. Gjennlegg med hvit; rød eller alsikekløver til frøproduksjon eller i blanding med gras til fôr med eller uten korn som dekkvekst.

Sammensetning:
Natriumsalt av bentazon 950 g/kg
(Tilsvarende 870 g bentazon pr. kg)
Andre stoffer 50 g/kg

FARE

Farlig ved svelging.
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeskade.
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kan forårsake grunnvannsforurensning.
VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN / en lege.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN / en lege.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Unngå innånding av støv/aerosoler.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Behandlingsfrist: Ert, bønne : 28 dager.

Avgiftsklasse 2

Tilvirker:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
Tyskland

Importør:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
Postboks 563
NO-1327 Lysaker
Tlf.: 66 79 21 00

Nødtilfelle:
BASF Service telefon:
+49 180 2273 112
Giftinformasjonen:
tlf. 22 59 13 00

REG.NR. 2006.23.14

Batchnr. / Produksjonsdato: Se emballasjen.
Holdbarhet: Minimum 2 år.

xxxx NO 1054

© = Registrert varemerke tilhørende BASF