

# Fungazil® 100 SL

Imazalil beisevæske

Soppmiddel mot foma, fusarium, blæreskurv og sølvskurv på settepoteter.

<b>Sammensetning:</b> Imazalil sulfat.....	133 g/l
(tilsvarende imazalil 100 g/l)	
<b>Fyllstoffer</b> .....	934 g/l

## FARE

Gir alvorlig øyeskade.

Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Unngå innånding av aerosoler.

VED KONTAKT MED ØYENNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Tilvirker: Certis Europe B.V., Belgia

Avgiftsklasse 2

Importør: AS Profilering  
Postboks 121  
1541 Vestby

® Registrert varemerke:  
Certis Europe B.V., Belgia

Reg.nr. 2008.74.14

2014.11

INNHOOLD:

5 liter

**Bruksrettleddingen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø.**  
**Det er forbudt å bruke FUNGAZIL 100 SL i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

**Bruksområde:** FUNGAZIL 100 SL er tillatt brukt til beising av settepoteter.

**Virkemåte:** FUNGAZIL 100 SL er et systemisk middel mot foma (Phoma spp.), Fusarium (Fusarium spp.), blæreskurv (Polyscytalum pustulans) og sølvskurv (Helminthosporium solani). FUNGAZIL 100 SL skal utsprøytes med et beiseutstyr til behandling av settepoteter.

**Bruksrettleddning:** Behandling av settepotetene skal skje umiddelbart etter opptak/ved innlagring. Ved behandling skal potetene være lett fuktige, men aldri våte. Ved påføring av FUNGAZIL 100 SL skal potetene rulle på transportbåndet, så de behandles på alle sider. God dekning av FUNGAZIL 100 SL på potetene som behandles sikres ved at det er lite jord på potetene, og at anlegget som benyttes gir god fordeling av sprøytevæsken (for eksempel "Mantis-anlegg"). Gode lagerforhold skal tilstrebes.

**Dosering:** Bruk 150 ml FUNGAZIL 100 SL uforynnet pr. tonn settepoteter. Eventuelt kan det tilsettes 1 - 2 liter vann hvis det anvendes hydrauliske dyser med en meget liten hullstørrelse, for eksempel "Mantis-anlegg". Doseringen skal overholdes. Det må verken over- eller underdoseres.

**Forsiktighetsregler:** Bruk vernehansker av gummi / nitril / neopren, vernebriller og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

**Rengjøring:** Skyll beiseutstyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vannforekomster.

**Avfallshåndtering:** Ubenyttede beisede settepoteter skal innleveres til mottak for farlig avfall. Tomemballasjen og preparatresten leveres til mottak for farlig avfall.

**Lagring:** Tåler ned til -5° C.

**Merk:** Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte, eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.