

# Fungaflash®

Imazalil - løselig konsentrat

Soppmiddel mot meldugg på agurk, tomat og pryplanter i veksthus.

**Sammensetning:** Imazalil..... 100 g/l  
Fyllstoffer..... 955 g/l

## FARE

Farlig ved svelging.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Gir alvorlig øyeskade.

Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)



201705

**Behandlingsfrist: 3 dager**

**Avgiftsklasse 3**

**Distribusjon i Norden:** Nordisk Alkali

**Registreringsinnehaver:** Certis Europe B.V.  
Safariweg 55,  
3605 MA Maarsen,  
Nederland

Reg.nr. 2009.1.17

© Registrert varemerke:  
Certis Europe B.V., NL

**INNHold:**

**1 liter**

**Bruksrettledningen må følges slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

**Bruksområde:** Fungaflash er tillatt brukt i agurk, tomat og pryplanter i veksthus.

**Virkemåte:** Fungaflash er et systemisk soppmiddel med forebyggende og kurativ effekt. På grunn av fare for utvikling av resistente soppstammer bør Fungaflash maksimalt brukes 4 ganger pr. vekstsesong i den samme kulturen. Det bør veksles med preparater som har en annen virkningsmekanisme.

**Generelt:** Behandling med Fungaflash starter ved begynnende angrep og gjentas med 7-10 dagers mellomrom avhengig av infeksjonstrykk og soppens aggressivitet. Det må ikke sprøytes i sol, eller så sent på ettermiddagen at bladene ikke tørker før natten. Fungaflash kan gi skader ved behandling på åpne blomster.

Fungaflash har vært brukt på en rekke kulturer uten at fytotoksiske skader er påvist. Grunnet det store antall kulturer som kan være aktuelt å behandle, samt varierende betingelser, anbefales generelt prøvebehandling av et mindre antall planter før hele kulturen behandles, for derigjennom å avdekke eventuelle problemer.

**Agurk:** Brukes i veksthus mot angrep av ekte meldugg (*Podosphaera fusca* og *Erysiphe cichoracearum*). Bruk 100 ml Fungaflash pr. 100 l vann. Ved bruk av 250 liter væske pr. dekar blir arealdosen 250 ml Fungaflash pr. dekar for ca. 2 meter høye planter. Konsentrasjonen er lavere enn den som benyttes for andre vekster, grunnet faren for sviskader.

Preparatet kan gi fytotoksiske skader i agurk, og er derfor ikke anbefalt å bruke i mer enn tre påfølgende behandlinger. Unge planter som er produsert i vinterhalvåret er følsomme og kan ta skade av Fungaflash. Ved skifte fra en sort til en annen eller ved endring av kulturbetingelsene i veksthuset, anbefales prøvesprøyting på et mindre antall planter før behandling av hele kulturen.

**Tomat:** Bruk 200 ml Fungaflash pr. 100 liter vann. Bruk 100 - 300 l væske pr. dekar avhengig av plantehøyde (sprøyt til begynnende avrenning).

**Pryplanter:** I pryplanter hvor man ikke har erfaring med bruk av preparatet, er det viktig å foreta prøvebehandling av et mindre antall planter for å vurdere eventuelle uønskede effekter på kulturen. I enkelte følsomme rosevarianter er det observert skade etter bruk av preparatet. I roser benyttes opptil 200 ml Fungaflash pr. 100 liter vann. I andre pryvekster benyttes 50 ml Fungaflash pr. 100 liter vann. Bruk ca. 100 liter væske pr. dekar (sprøyt til begynnende avrenning).

**Blanding:** Fungaflash skal ikke blandes med andre preparater.

**Forsiktighetsregler:** Bruk vernehansker av nitril/neopren, vernebriller og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Tilsølt klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

**Håndteringsfrist:** Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

**Rengjøring:** Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vannforekomster.

**Avfallshåndtering:** Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

**Lagring:** Oppbevares frostfritt.

**Merk:** Levandøren garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skade på kulturen, utilstrekkelig effekt, eller andre forhold som oppstår ved bruk av preparatet.

420559