



Pirimikarb - vannløselig granulat

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydpanter og jordbær i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg, fyllstoffer 500 g/kg

FARE

Giftig ved svelging.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Farlig ved innånding.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Giftig for bier og andre insekter.

Unngå innånding av aerosoler.

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Behandlingsfrister

Tomat, agurk, paprika og jordbær: 4 dager

Salat og krydderurter: 10 dager

REG. NR. 2011.19.14

Avgiftsklasse 2

Nettoinnhold: 1 KG

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveits

Importer

Syngenta Nordics A/S, Karjolkroken 258, Asper gård, 1820 Spydeberg

Telefon 41 93 44 43



5 707239 400810

L1008315 NORW/03T PPE 4049988



syngenta®

INSEKTMIDDEL

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, kryd-
derurter, prydplanter og jordbær i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 KG



TM

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE OG VIRKEOMRÅDE

Pirimor® er tillatt brukt i veksthus mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær.

BEHANDLINGSFRISTER

Tomat, agurk, paprika, og jordbær: 4 dager. Salat og krydderurter: 10 dager.

VIRKEMÅTE

Pirimor® har rask virkning mot bladlus - også mot bladlus som er blitt resistent mot fosformidler - ved kontakt, fordamping og inntrenging i bladene. Pirimor® gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus.

NYTTEORGANISMER

Pirimor® er godt egnet i integrert plantevern. Pirimor® har liten til middels skadevirkning mot mange nytteorganismer (inkludert pollinatorer), og har relativt kort ettervirkningstid (maks 1 uke). Pirimor® kan derfor benyttes i kombinasjon med biologisk bekjempelse i veksthus.

RESISTENS

Pirimor® tilhører middelgruppen 1A: Karbamater. Resistens mot Pirimor® er vanlig hos ferskenbladlus og agurkbladlus i Norge.

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling er det følgende begrensninger i bruk av Pirimor®:

- Pirimor® skal maksimalt brukes to ganger etter hverandre. De to behandlingene skal utføres innen en periode på 7 dager. Ved behov for ytterligere behandlinger mot bladlus, skal det brukes et middel fra minst én annen middelgruppe eller nyttedyr før behandling med Pirimor®.
- Pirimor® bør ikke blandes med, eller brukes rett før eller etter behandling med midler i gruppe 1B Organiske fosformidler, pga. fare for kryssresistens.
- Pirimor® bør ikke brukes mot ferskenbladlus og agurkbladlus.

BRUKSRETTLEDNING

Tomat, agurk og paprika i veksthus

Konsentrasjon:	Bruk 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann.
Maks arealdose:	75 g per behandling per 1000 m ² nettoareal.
Normal væskemengde:	Bruk 60-200 liter vann per 1000 m ² nettoareal. Brukes mer enn 150 liter vann per 1000 m ² nettoareal må konsentrasjonen reduseres så ikke maks arealdose overskrides.
Behandlingstid:	Ved begynnende angrep.
Antall behandlinger:	1-2 med 7 dagers intervall.

Salat og krydderurter i veksthus

Konsentrasjon:	Bruk 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann.
Maks arealdose:	50 g per behandling per 1000 m2 nettoareal.
Normal væskemengde:	Bruk 50-100 liter vann per 1000 m2 nettoareal.
Behandlingstid:	Ved begynnende angrep.
Antall behandlinger:	1-2 med 7 dagers intervall.

Prydplanter i veksthus

Konsentrasjon:	Bruk 50 g Pirimor® pr. 100 liter vann.
Maks arealdose:	75 g per behandling per 1000 m2 nettoareal.
Normal væskemengde:	

Plantestørrelse	Væskemengde per 1000 m2 nettoareal
Lave planter (< 40 cm)	50-100
Middels høye planter (ca. 50 cm)	100-150
Høye planter (ca 1 m)	150-200

Brukes mer enn 150 liter vann per 1000 m2 nettoareal må konsentrasjonen reduseres så ikke maks arealdose overskrides.

Behandlingstid:	Ved begynnende angrep
Antall behandlinger:	1-2 med 7 dagers intervall.

Jordbær i veksthus

Bruk 50 g Pirimor® i 50-200 liter vann per 1000 m2. Behandlingstid ved begynnende angrep. Maks 2 behandlinger med 7 dagers intervall.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., øyevern og overtrekksklær ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt middel.

AVFALLSHÅNTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Pirimor®

L1008315 NORW/03T PPE 4049988



syngenta®

INSEKTMIDDEL

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter, prydplanter og jordbær i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 KG



TM