

L1005186 NORW/12S PPE 4046454



syngenta®

## SOPPMIDDEL

Mot sopp på gras på golfbaner og i grøntanlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME  
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON  
are Trademarks of a Syngenta Group Company

# 3 L

TM



### Fludioksonil - suspensjonskonsentrat

Mot sopp på gras på golfbaner og i grøntanlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Fludioksonil 125 g/l, fyllstoffer 937 g/l



UN3082  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S. (FLUOROKRONE)

#### ADVARSEL

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Kan forårsake grunnvannsforurensning.  
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.  
Unngå innånding av aerosoler.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

REG. NR. 2014.43

Avgiftsklasse 3

## Nettoinnhold: 3 L

#### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Karjolkroken 258, Asper gård  
1820 Spydeberg  
Telefon 41 93 44 43



5 707239 400896



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## **BRUKSOMRÅDE**

Medallion<sup>®</sup> TL er tillatt brukt mot sopp på gras i grøntanlegg som omfatter plen og grasbakke i f.eks. parker, kirkegårder, veianlegg, golfbaner og idrettsanlegg.

## **VIRKEOMRÅDE**

Medallion<sup>®</sup> TL virker mot microdochium flekk og rosa snømugg forårsaket av *Microdochium nivale*. Medallion<sup>®</sup> TL virker også noe mot brunflekk (*Drechslera spp.*) og antraknose (*Colletotrichum graminicola*).

## **VIRKEMÅTE**

Medallion<sup>®</sup> TL er et bredspektrert forebyggende soppmiddel med kontaktvirkning. Det antas å virke på osmotisk signaloverføring i soppen. Middelet hemmer sporespiring, og vekst av mycel på planteoverflaten før infeksjon.

## **RESISTENS**

Fludioksonil tilhører den kjemiske gruppen fenylypyrroler (FRAC gruppe E2). Mange sopp sykdommer kan utvikle resistens mot plantevernmidler som brukes gjentatte ganger.

For å redusere sannsynligheten for utvikling av resistens anbefales det at Medallion<sup>®</sup> TL brukes i et bekjempelsesprogram som også inkluderer soppmidler fra andre kjemiske grupper, f.eks triazoler og/eller strobiluriner.

## **BRUKSRETTLEDNING**

### Dose og behandlingstidspunkt

#### Behandlingstidspunkt mot sopper i veksttiden

Når forholdene er gode for sykdomssmitte (fuktige forhold) eller ved første tegn på sykdomsangrep.

#### Behandlingstidspunkt mot rosa snømugg

Brukes kort tid før forventet snødekke.

Dose: 300 ml Medallion<sup>®</sup> TL i 12,5-50 liter vann per daa.

Maks 4 ganger per sesong og minst 14 dager mellom hver behandling.

### Begrensninger

Skal ikke brukes på frossen mark eller ved tørke eller når det er ekstremt varmt eller ekstremt fuktig.

## **TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE**

Medallion<sup>®</sup> TL kan påføres ved hjelp av alle typer sprøyteutstyr.

### Traktormonterte/etterhengte sprøyter

Kontroller at sprøyten er ren og justert til å gi en jevn påføring ved riktig mengde og jevn fordeling. Fyll sprøytetanken halvfull med ønsket mengde rent vann, og start omrøring. Tilsett ønsket mengde Medallion<sup>®</sup> TL i sprøytetanken. Rør blandingen godt om før bruk, og fortsett omrøring under sprøyting. Ferdigblandet sprøytevæske skal brukes umiddelbart.

## Håndholdte sprøyter og ryggsprøyter

Fyll sprøytetanken halvfull med rent vann og tilsett ønsket mengde Medallion® TL i tanken. Fyll opp, rør godt om og bruk umiddelbart.

### **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker av polykloropren og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

### **HÅNDBTERINGSFRIST**

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

### **RENGJØRING**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

## **AVFALLSHÅNTERING**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## **LAGRING**

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

## **MERK**

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

### ***Registrerte varemerker***

*Syngenta Group Company: Medallion®*





### Fludioksonil - suspensjonskonsentrat

Mot sopp på gras på golfbaner og i grøntanlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammenstilling:** Fludioksonil 125 g/l, fyllstoffer 937 g/l



UN3082  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,  
LIQUID, N.O.S., (FLUOROKSOL)

#### ADVARSEL

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Kan forårsake grunnvannsforurensning.  
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.  
Unngå innånding av aerosoler.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

REG. NR. 2014.43

Avgiftsklasse 3

## Nettoinnhold: 3 L

#### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Karjolkroken 258, Asper gård  
1820 Spydeberg  
Telefon 41 93 44 43



5 707239 400896