

Monty-line am

Tripsrovmidd (*Amblyseius montdorensis*)

Bruksformål: Mot trips og mellus, samt enkelte andre skadedyr som f.eks dvergmidd, bladmidd og spinnmidd i veksthuskulturer.

Sammensetning: Alle stadier av *Amblyseius montdorensis* blandet med hvetekli og melmidd (*Thyreophagus entomophagus*).



**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Unngå innånding av støv.
Unngå hudkontakt.**

Tilvirker: Bioline Agrosiences Ltd. Telstar Nursery Holland Road, Little Clacton Essex CO16 9QG. England

Importør: NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

Reg. nr.: 2017.10

Netto innhold: se forpakning

**Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

Bruksområde:

Brukes i varmekjære kulturer i veksthus, og eventuelt i plasttunnell som f.eks paprika, agurk, tomater, gerbera og roser.

Virkeområde:

Bekjemper ulike trips, mellus og ev. midd (f.eks dvergmidd, bladmidd og spinnmidd)

Virkemåte:

Voksne hunnmidd legger egg enkeltvis på bladhårene. Etter 1-2 dager klekkes eggene. Larvene utvikler seg til protonymfer og deutonymfer før voksen tilstand. Alle mobile stadier av organismen er predatoriske. Den livnærer seg av egg og larver men spiser ikke voksne individer. De har høy mobilitet.

Brukes så snart nattetemperaturen og nymfer når 15 °C, og dagtemperaturen er høyere enn 20 °C.

Utseende:

Fullvoksne og nymfer: 0,4 – 0,5 mm lang. Gjennomsiktig hvite til blekrosa. Dråpeformet med korte bein.

Egg: Runde gjennomsiktige til hvite. Vanligvis festet til bladhår på undersiden av bladene.

Klimakrav:

Luftfuktighet (RH) bør være over 60-65%. Optimal temperatur er mellom 20-27 °C. Tåler kortere perioder med lave temperaturer (12-18 °C).



SNU

NORGRO

Bruksretledning:

Start tidlig i sesongen, så snart temperaturen tillater det. Bør settes inn før kulturer av kvitfly eller trips rekker å etablere seg. Start gjerne med Montyline i løs vekt, følg deretter på med bruk av småposer. Bruk dosen som anbefalt i tabellen under.

Lvert løst: Bland midden med fyllstoffet ved å dunke beholderen forsiktig på en hard overflate og rull eller vend beholderen flere ganger. Åpne beholderen ved den infiserte kulturen og spre innholdet over bladverket.

Lvert i småposer: I høye kulturer henges posene nederst på infiserte planter på hver 2. plante. I lave kulturer legges posene på plantene eller dyrkingsmediet. Unngå å plassere posene i direkte sollys eller i nærheten av varmerør. Hver pose vil være aktiv i 4-6 uker.

Løst:	Antall pr m ²	Ant. m ² pr 25 000 dyr	Intervall	Ant. Behandlinger
Forebyggende	20	1 250		
Lett bekjempelse	50	500	Minst 2X	
Kraftig bekjempelse	100	250	Minst 2X	
Poser à 300 dyr:	Antall poser/ m ²	Antall m ² /500 poser		
Forebyggende	0,33	1500	Hver 6. uke	
Lett bekjempelse	0,33	1500	Hver 4. uke	
Kraftig bekjempelse	0,83	600	Hver 4. uke	

Integrert plantevern:

A. montdorensis kan med fordel suppleres med de fleste andre nytteorganismer mot trips, mellus og andre skadegjørere.

Lagring:

Oppbevar tuber med Montyline am horisontalt. Tåler ikke direkte sollys. Skal ikke i kjøleskap. Produktet bør brukes innen 18 timer etter ankomst. Korttidslagres mørkt ved 10-15°C i mørke.

Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker, åndedretsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdato (evt. batchnr.): Se forpakning

**NORGRO**