

## APHIDOcontrol

Bladlusgallmygg (*Aphidoletes aphidimyza*)

### Bruksformål:

Mot bladlus på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørs.

### Sammensetning:

Inneholder puppestadiet av *Aphidoletes aphidimyza* i vermkulitt.

**Tilvirke:** Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745

**Importør:** Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge

**Reg.nr:** 2018.22

**Netto innhold:** Se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.**

### Bruksområde:

Bærevkster, frukt, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel. I innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.)

### Virkeområde:

Angriper de fleste bladlusarter. Anbefales spesielt når det har blitt kolonier med bladlus. De kan også spise mellus, rovmidd eller andre små byttedyr hvis det ikke er tilstrekkelig med bladlus.

### Virkemåte:

Voksne individer er aktive i mørket. Egg blir lagt bladluskolonier, hvor gallmygglarvene lammer bladlusene og suger ut kroppsvæsken. Lusene skrumper inn før de går i oppløsning.

### Utseende:

Voksne: 2.5 mm, spinkle gråsvarte gallmygg med lange bein.

Egg: Avlange, 0.1 x 0.3 mm, oransje/rødlige og skinnende.

Larver: 0.3-3.0 mm, oransje og finnes oftest i bladluskolonier.

Puppe: 2 mm lang, i en kokong i vekstmediet, dekket med torv, sand eller jordpartikler.

### Klimakrav:

Høy fuktighet (> 60 % RF) er viktig for utvikling av voksne *Aphidoletes aphidimyza*. De fungerer best ved temperaturer mellom 18 og 28 °C, og nattetemperaturen må være over 16 °C. Larvene må ha minst 15,5 timers lys for å unngå at de går i diapause i puppestadiet. Puppestadiet krever organisk vekstmedium (torv, sand, jord) for utvikling. Voksne er nattaktive og krever skumring/mørke for parring og egglegging.

### Bruksrettledning:

Før åpning av flasken, la den stå horisontalt og rotere for å blande innholdet. Fordel innholdet på planter hvor det finnes bladlus, eller fordel i bokser i kulturen.

Dosering:

	Antall dyr/ m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 1000 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	-	-	-	-
Lett bekjempelse	1	1000	Hver uke	Minst X 3
Kraftig bekjempelse	10	100	Hver uke	Minst X 3

#### **Integrert plantevern:**

*A. aphidimyza* kan brukes samtidig med de fleste nytteorganismene, spesielt snylteveps (*Aphidius* spp.). Den er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list»).

#### **Lagring:**

Oppbevar flasken eller boksen horisontalt og i temperaturer mellom 10-15 °C. Produktet bør ikke lagres lengre enn 48 timer. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering. De tåler ikke direkte sollys.

#### **Forsiktighetsregler:**

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

#### **Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdata (evt. Bachnr):** Se forpakning