



Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat

Vekstregulerende middel mot legde i hvet, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjen-legg, samt grasrøeng.

Sammensetning: Trineksapaketyl 250 g/l, Fyllstoffer 740 g/l



ADVARSEL

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritation: Søk legehjelp.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL)

Nettoinnhold: 5 L

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2019.13

Avgiftsklasse 1



5 707239 401121



Moddevo™

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Moddevo™ er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og redusere legde i høst- og vårhvete, høst- og vårbygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng.

VIRKEMÅTE

Moddevo opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten og virker på den delen av planten som er i aktiv vekst ved behandlingstidspunktet. Moddevo regulerer plantens vekst, forkorter og styrker strået og reduserer derved legde og stråknakk.

BRUKSRETTLING

Vekstregulering med Moddevo foretas i frodig åker med utsikter til gode vekstforhold, ved fare for legde.

Doseringstabell:

KULTUR	BEHANDLINGSTIDSPUNKT (BBCH)*	DOSERING (ml/daa) **	Merknad
Høst- og vårhvete	25 - 49	1 x 30 eller 2 x 15	Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dagers intervall. Væskemengde: 10-40 l/daa
Vår- og høstbygg	25 - 49	1 x 60 eller 2 x 30	
Havre	25 - 32	1 x 30 eller 2 x 15	
Rug	25 - 30	1 x 50 eller 2 x 25	
Rughvete	25 - 49	1 x 50 eller 2 x 25	
Grasfrøeng	30-49	1 x 80 eller 2 x 40	Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dagers intervall. Væskemengde: 10-40 l/daa Optimalt behandlingstidspunkt: Timotei, hundegras, engrapp og kvein-arter: BBCH 31-49 Engsvingel: BBCH 31-44 Rødsvingel og raigras: BBCH 40-45 Bladfaks: BBCH 44-49

* I kornartene vil tidlig behandling gi mindre stråforkorting enn senere behandling.
**Ved blanding med soppmidler som inneholder triazolol kan dosen reduseres med 20%, dog ikke lavere enn 15 ml/daa.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Ryst dunken med Moddevo omhyggelig og tilsett tilmålt mengde under omrøring. Fyll så opp sprøytetanken under omrøring og sprøyt ut middelet. Doserings-anbefalingen gjelder med vannmengde på 10-40 l/daa.

VÆR OG VEKSTFORHOLD

Sprøyt på tørre planter. Best effekt får en ved sprøyting om morgenen eller formiddagen ved relativt høy luftfuktighet, samt i sol. Moddevo er regnfast etter 2 timer.

Under optimale opptaksforhold bør dosen reduseres. Vekstregulering bør bare brukes i frodig åker med risiko for legde. Moddevo må ikke brukes i åker som er under stress på grunn av sykdomsangrep/tørke eller dårlig næringstilgang (humusfattig jord).

BLANDBARHET

Moddevo kan blandes med aktuelle soppmidler, flere insektsmidler og bladgjødslingsmidler i chelatform. Moddevo kan blandes med de fleste ugrasmidler, men ikke Ally Class 50 WG, eller Puma Extra.

Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. Ved blanding med soppmidler som inneholder triazolol kan Moddevo dosen reduseres med 20 %, dog ikke lavere enn 15 ml/daa.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 benyttes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøytetutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vann- forekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytetutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte prepara-trester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Lagres frostfritt.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndte-res eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Moddevo™



Trineksapaketyl - emulsjonskonsentrat

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjen-legg, samt grasrøeng.

Sammensetning: Trineksapaketyl 250 g/l, Fyllstoffer 740 g/l



ADVARSEL

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritation: Søk legehjelp.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL)

Nettoinnhold: 5 L

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

REG. NR. 2019.13

Avgiftsklasse 1



5 707239 401121

