

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51

Ranman Top – Cyazofamid + Fyllstoffer

Godkjent av Mattilsynet: 06.07.2017

Gyldig t.o.m. : 31.07.2019

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

I
Tillegg
til
prepara
tets

ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel (Fylles ut av Mattilsynet)

Alternativ 1:

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett.

Bruksområde

Godkjenningen gjelder for bruk mot agurkbladskimmel, *Pseudoperonospora cubensis*, i frilandsagurk.

Antall behandlinger:

Maksimalt 4 ganger per vekstsesong. Det bør brukes midler med andre virkemekanismer mellom hver behandling.

Behandlingsfrist:

3 dager

Bruksrettledning

Brukes forebyggende ved fare for angrep. Veksle med midler med annen kjemi. Ranman Top brukes maksimalt 4 ganger per kultur. Behandling med 7 dagers mellomrom ved stort smittepress. Ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag.

Dosering:

50 ml (0,05 l) per daa i 20-40 liter vann.

Påføring:

Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Ranman Top kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassistert sprøyte. Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Ranman Top er regnfast når sprøytevæsken har tørket opp på bladverket.